

ACARSHOT 50 SC

ACARICIDA

ACARSHOT 50 SC es un acaricida que actúa por contacto e ingestión, sobre formas móviles de ácaros: larvas, ninfas y adultos, incluso resistentes a los acaricidas convencionales.

COMPOSICIÓN

COMPONENTES CONTENIDO (g/L)

Fenpyroximate

50

Aditivos

c.s.p. 1L

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO

ACARSHOT 50 SC está categorizado como Ligeramente Peligroso. Franja azul.

COMPATIBILIDAD

Es incompatible con materiales ácidos y alcalinos fuertes. Se recomienda realizar un test de compatibilidad antes de aplicar.

COMPORTAMIENTO CON EL MEDIO AMBIENTO

Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar lixivia hacia aguas subterráneas.

MODO DE ACCIÓN

ACARSHOT 50 SC es un acaricida e inhibidor del transporte de electrones del Complejo I mitocondrial con acción de contacto, un modo de acción comparable en todas las especies. Se considera que los efectos observados son consecuencia del daño oxidativo relacionado con la interrupción de la cadena respiratoria redox mitocondrial.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido

Color: Blanco

Olor: Ligero olor

pH: 6-7

Densidad: 1.04 g/mL.

DOSIFICACIÓN

CULTIVO	PLAGA QUE CONTROLA	DOSIS L / ha	DOSIS L/200 L	RECOMENDACIONES
PALTO	Ácaro <i>Oligonychus punicae</i>	-	0.2 - 0.225	<p>Aplicaciones máximas por campaña: 2</p> <p>Periodo de reingreso: 24 horas</p> <p>Periodo de carencia: 7 días</p> <p>LMR: 0.20 ppm</p>

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Si es por vía aspersión foliar terrestre, hasta 2 aplicaciones por campaña, 1 campaña al año, y una frecuencia entre aplicaciones de 15 a 30 días. El momento de aplicación es ante la aparición de los primeros individuos o cuando el daño esté por alcanzar el umbral económico.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar vertiendo el producto en un recipiente pequeño, pre-mezclar todo el producto a usar con un poco de agua hasta que se forme una solución uniforme, la misma que se debe verter en el tanque de aplicación que tiene 50% de su capacidad con agua, agitar y luego llenar con agua hasta completar su capacidad.

RECOMENDACIONES EN CAMPO

No lo aplique como humo, aerosol o nebulizado. Se aplica en pulverizaciones en mezcla con agua. Se debe emplear altos volúmenes de agua con el objeto de lograr una buena cobertura del cultivo.

En caso a utilizar algún coadyuvante, inicialmente se debe diluir bien el acaricida antes de agregar el coadyuvante. Es incompatible con productos de reacción alcalina.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Mantener el producto en los envases originales, herméticamente cerrados, en un lugar seco, fresco y bien ventilado fuera del alcance de los niños.

Mantener lejos de alimentos, bebidas y otros productos de consumo humano o pecuario.

