



BOSCABIN 380 WG

FUNGICIDA

BOSCABIN 380 WG es un un fungicida con acción sistémica traslaminar, que inhibe la germinación de esporas y la respiración del patógeno.

COMPOSICIÓN

NOMBRE	CONTENIDO (g/Kg)
Boscalid	252 g/Kg
Pyraclostrobin	128 g/Kg
Aditivos	c.s.p. 1kg

COMPATIBILIDAD

Es incompatible con compuestos ácidos y alcalinos fuertes. En caso de dudas sobre la compatibilidad efectuar pruebas en pequeña escala antes de aplicar.

COMPORTAMIENTO CON EL MEDIO AMBIENTE

Muy tóxico para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO

BOSCABIN 380 WG está categorizado como Ligeramente Peligroso. Franja azul.

MODO DE ACCIÓN

BOSCABIN 380 WG es un fungicida con acción sistémica traslaminar, que inhibe la germinación de esporas y la respiración del patógeno interrumpiendo la cadena de transporte de electrones en la mitocondria.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	: Sólido
Color	: Blanco
pH	: 5-9



DOSIFICACIÓN

CULTIVO	PLAGA QUE CONTROLA	DOSIS Kg / ha	DOSIS Kg/CiL	RECOMENDACIONES
PALTO	Podredumbre/Moho gris <i>Botrytis cinerea</i>	1.0-1.75	-	Aplicaciones máximas por campaña: 2 Periodo de reingreso: 12 horas Periodo de carencia: 1 día LMR: 1.5 0.6 ppm
PALTO	Cladosporium <i>Cladosporium herbarum</i>	1.0-1.75	-	

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar, vía aspersión foliar terrestre, en palto, hasta 2 aplicaciones por campaña considerando 1 campaña al año, y una frecuencia entre aplicaciones de 30 días; ante la aparición de los primeros síntomas o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

RECOMENDACIONES DE USO

Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.

RECOMENDACIONES EN CAMPO

Utilice suficiente volumen de agua en las aplicaciones.

Se recomienda aplicar preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Seguir una estrategia basada en la adopción de programas de rotación, con aplicaciones intercaladas, con fungicidas de diferentes grupos de acción.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.

El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.

No almacenar en casas de habitación.

