

BACFEST 70 WP

FUNGICIDA

BACFEST 70 WP es un fungicida bactericida microbiano de acción protectante, ejerciendo efecto preventivo, curativo y controlador eficaz de enfermedades.

COMPOSICIÓN

NOMBRE	CONTENIDO (g/Kg)
<i>Bacillus subtilis</i> IAB/BS03	70
Aditivos	c.s.p. 1

COMPATIBILIDAD

Es incompatible con materiales ácidos y alcalinos fuertes. Se recomienda realizar un test de compatibilidad antes de aplicar.

COMPORTAMIENTO CON EL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO

BACFEST 70 WP está categorizado como un agente biológico. Etiqueta verde.

MODO DE ACCIÓN

BACFEST 70 WP utiliza un mecanismo directo incluye la síntesis de muchos metabolitos secundarios, hormonas, enzimas que degradan la pared celular y antioxidantes que ayudan a la planta a defenderse del ataque de los patógenos; mientras que, el indirecto incluye la estimulación del crecimiento de la planta y la inducción de la resistencia sistémica adquirida.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	: Sólido
Color	: Blanco
Olor	: Inodoro
pH	: 6

DOSIFICACIÓN

CULTIVO	PLAGA QUE CONTROLA	DOSIS Kg / ha	DOSIS Kg/200 L	RECOMENDACIONES
PALTO	Muerte regresiva <i>Lasiodiplodia theobromae</i>	3.0-4.0	-	Aplicaciones máximas por campaña: 2 Periodo de reingreso: 12 horas Periodo de carencia: No aplica LMR: No aplica
	Podredumbre / Moho gris <i>Botrytis cinerea</i>	2.0-3.5	-	
	Cladosporium <i>Cladosporium herbarum</i>	3.0-4.0	-	

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar, vía aspersión foliar terrestre, en palto, hasta 2 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña al año, y una frecuencia entre aplicaciones de 7 - 10 días; ante la aparición de los primeros síntomas o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

RECOMENDACIONES DE USO

Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.

RECOMENDACIONES EN CAMPO

Utilice suficiente volumen de agua en las aplicaciones.

Se recomienda aplicar preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Evite la inhalación e ingestión del polvo.

Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.