

## CASPIRO 251 SC

### ACARICIDA

**CASPIRO 251 SC** es un insecticida no-sistémico, disruptor del desarrollo de los ácaros, inhibidor de la biosíntesis de lípidos, con un efecto por contacto.

#### COMPOSICIÓN

COMPONENTES	CONTENIDO (G/L)
Spirodiclofen	251
Aditivos	c.s.p 1 L

#### TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO

**ACARVECTIN** está categorizado como Ligeramente Peligroso. Etiqueta azul.

#### COMPATIBILIDAD

**CASPIRO 251 SC** es incompatible con materiales ácidos y alcalinos fuertes. Se recomienda realizar un test de compatibilidad antes de aplicar.

#### MODO DE ACCIÓN

**CASPIRO 251 SC** influye en la regulación endocrina asociada al desarrollo de los ácaros, quizás en el proceso de muda en particular; además, reduce considerablemente la fertilidad en hembras adultas al inhibir la puesta de huevos

#### COMPORTAMIENTO CON EL MEDIO AMBIENTE

Muy tóxico para organismos acuáticos. Por ello, no contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas

#### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

<b>Estado físico</b>	: Líquido
<b>Color</b>	: Blanco
<b>Olor</b>	: Débil, característico
<b>pH</b>	: 4 - 8.5
<b>Solubilidad en agua</b>	: Miscible



## DOSIFICACIÓN

CULTIVO	PLAGA QUE CONTROLA	DOSIS L / ha	DOSIS L / 200 L	RECOMENDACIONES
PALTO	Ácaro <i>Oligonychus punicae</i>	0.5 - 1	-	Aplicaciones máximas por campaña: 2 Periodo de reingreso: 24 horas Periodo de carencia: 7 días LMR: 1 ppm

## FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Si es por aspersión foliar terrestre, hasta 2 aplicaciones por campaña, 1 campaña al año, y una frecuencia entre aplicaciones de 30 días; ante la aparición de los primeros síntomas o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad

## RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar **CASPIRO 251 SC** vertiendo el producto en un recipiente pequeño, pre-mezclar todo el producto a usar con un poco de agua hasta que se forme una solución uniforme, la misma que se debe verter en el tanque de aplicación que tiene 50% de su capacidad con agua, agitar y luego llenar con agua hasta completar su capacidad.

### RECOMENDACIONES EN CAMPO

Por tratarse de un producto de contacto, para lograr un óptimo control se requiere de completa cobertura de las partes infestadas. Privilegiar siempre un buen cubrimiento de la copa a tratar.

No aplicar si se ha usado Spirotetramat. En los años 2017 y 2018 esta plaga presentó resistencia al acaricida, tomar en cuenta para el MIP.

### ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenar en el envase original cerrado, en un lugar bien ventilado, lo más fresco posible.

No almacenar por períodos prolongados en la luz solar directa.

No almacene cerca de alimentos, piensos, fertilizantes o semillas. Almacenar a temperatura ambiente.