

ETOXARAK 110 SC

ACARICIDA

ETOXARAK 110 SC es un acaricida no sistémico que actúa por contacto e ingestión sobre ácaros e insectos. Origina la alteración de la muda, del crecimiento y del desarrollo de los estados inmaduros (larvas y ninfas).

COMPOSICIÓN

COMPONENTES CONTENIDO (g/L)

| | |
|-------------------|------------|
| Etoxazole | 110 |
| Inertes solventes | c.s.p. 1 L |

COMPATIBILIDAD

Es incompatible con materiales ácidos y alcalinos fuertes. Se recomienda realizar un test de compatibilidad antes de aplicar.

COMPORTAMIENTO CON EL MEDIO AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar lixivia hacia aguas subterráneas

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO

ETOXARAK 110 SC está categorizado como Ligeramente Peligroso. Franja azul.

MODO DE ACCIÓN

ETOXARAK 110 SC posee acción de contacto, es un agonista de la hormona de la muda, que actúa inhibiendo la muda afectando la biosíntesis de la quitina en algunas larvas.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| | |
|---------------|-----------|
| Estado físico | : Líquido |
| Color | : Blanco |
| Olor | : Inodoro |
| pH | : 6-8.5 |

DOSIFICACIÓN

| CULTIVO | PLAGA QUE CONTROLA | DOSIS L / ha | DOSIS L/200 L | RECOMENDACIONES |
|---------|-------------------------------------|--------------|---------------|--|
| PALTO | Ácaro <i>Oligonychus punicae</i> | - | 0.06-0.1 | <p>Aplicaciones máximas por campaña: 2</p> <p>Periodo de reingreso: 24 horas</p> <p>Periodo de carencia: 1 día</p> <p>LMR: 0.2 ppm</p> |

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Si es por vía aspersión foliar terrestre, hasta 2 aplicaciones por campaña, 1 campaña al año, y una frecuencia entre aplicaciones de 30 días; ante la aparición de los primeros daños o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la plaga.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar vertiendo el producto en un recipiente pequeño, pre-mezclar todo el producto a usar con un poco de agua hasta que se forme una solución uniforme, la misma que se debe verter en el tanque de aplicación que tiene 50% de su capacidad con agua, agitar y luego llenar con agua hasta completar su capacidad.

RECOMENDACIONES EN CAMPO

Aplicar con intervalo de 5 a 7 días de acuerdo a las condiciones del clima y el desarrollo de las poblaciones de ácaros.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Evite temperaturas extremas para el almacenamiento, en un espacio limpio, seco y fresco.

Mantenga los envases bien cerrados cuando no se estén usando y alejado de bebidas, alimentos, forrajes y fuera del alcance de los niños.

