

LASIONET 230 SC

FUNGICIDA

LASIONET 230 SC es un un fungicida de contacto, de amplio espectro. Tiene actividad preventiva y residual, con actividad sobre la esporulación de los hongos, garantizando un alto nivel de eficacia.

COMPOSICIÓN

NOMBRE	CONTENIDO (g/L)
Fludioxonil	230
Aditivos	c.s.p. 1L

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO

LASIONET 230 SC está categorizado como Ligeramente Peligroso. Franja azul.

COMPATIBILIDAD

Es incompatible con materiales ácidos y alcalinos fuertes. Se recomienda realizar un test de compatibilidad antes de aplicar.

COMPORTAMIENTO CON EL MEDIO AMBIENTE

Muy tóxico para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

MODO DE ACCIÓN

LASIONET 230 SC es un fenilpirrol que actúa inhibiendo la proteína kinasa mitogeno activada (MAP) involucrada en la ruta de transducción de las señales osmoregulatorias en los hongos. Fludioxonil inhibe el transporte asociado a la fosforilación de la glucosa, reduciendo el crecimiento del micelio.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	: Líquido
Color	: Blanco
pH	: 4-9

DOSIFICACIÓN

CULTIVO	PLAGA QUE CONTROLA	DOSIS L / ha	DOSIS L/200 L	RECOMENDACIONES
PALTO	Muerte regresiva <i>Lasiodiplodia theobromae</i>	-	0.4	Aplicaciones máximas por campaña: 2 Periodo de reingreso: 24 horas Periodo de carencia: 14 días LMR: 1.5 ppm

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar, vía aspersion foliar terrestre (dirigido al follaje del cultivo), hasta 2 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña al año (palto), y una frecuencia entre aplicaciones de 30 días; el momento de aplicación es ante la aparición de los primeros síntomas o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar vertiendo el producto en un recipiente pequeño, pre-mezclar todo el producto a usar con un poco de agua hasta que se forme una solución uniforme, la misma que se debe verter en el tanque de aplicación que tiene 50% de su capacidad con agua, agitar y luego llenar con agua hasta completar su capacidad.

RECOMENDACIONES EN CAMPO

Utilice suficiente volumen de agua en las aplicaciones.

Se recomienda aplicar preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Seguir una estrategia basada en la adopción de programas de rotación, con aplicaciones intercaladas, con fungicidas de diferentes grupos de acción

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Evite la inhalación de polvo / humo / gas / niebla / vapor / aerosol. Evite el contacto prolongado o repetido.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación

Mantenga el contenedor cerrado.

