

RESTRAIN 250 SC

REGULADOR DE CRECIMIENTO

RESTRAIN 250 SC es un regulador de crecimiento de plantas sistémico. Está compuesto por Paclobutrazol y aditivos.

COMPOSICIÓN

NOMBRE	CONTENIDO (g/L)
Paclobutrazol	250 g/L
Aditivos	c.s.p. 1L

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO

RESTRAIN 250 SC está categorizado como Ligeramente Peligroso. Franja azul.

COMPATIBILIDAD

Es incompatible con materiales ácidos y alcalinos fuertes. Se recomienda realizar un test de compatibilidad antes de aplicar.

COMPORTAMIENTO CON EL MEDIO AMBIENTE

Tóxico para organismos acuáticos. No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros. No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MODO DE ACCIÓN

RESTRAIN 250 SC actúa en forma sistemática en la planta, inhibe la síntesis de ácido giberélico para dar lugar a una división y elongación lenta sin causar toxicidad a las células vegetales. Se aplica para mejorar el crecimiento y rendimiento de los cultivos señalados en el cuadro de usos.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	: Sólido
Color	: Blanco
Olor	: Inodoro



DOSIFICACIÓN

CULTIVO	INDICACIONES DE USO		DOSIS L/ha	RECOMENDACIONES
PALTO	1° Aplicación (floración) 2.5-3.0	2° Aplicación (cuaja) 1.5-2.0	4.0-5.0	Aplicaciones máximas por campaña: 2 Periodo de reingreso: 24 horas Periodo de carencia: 150 días LMR: 0.01 ppm

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar, vía aspersión foliar terrestre, 2 aplicaciones por campaña (la 1ra durante la floración y la 2da durante el crecimiento y/o cuaja del fruto), 1 campaña al año, y una frecuencia entre aplicaciones de 50 - 60 días.

RECOMENDACIONES DE USO

Se prepara vertiendo el producto en un recipiente pequeño, se agrega agua hasta que se forme una solución uniforme y luego se vierte en el tanque de aplicación que tiene el 50% de su capacidad con agua, agitar y luego llenar con agua hasta completar su capacidad.

RECOMENDACIONES EN CAMPO

Utilice suficiente volumen de agua en las aplicaciones.

Se recomienda aplicar preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Seguir una estrategia basada en la adopción de programas de rotación, con aplicaciones intercaladas, con fungicidas de diferentes grupos de acción

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

