

**STROBZOL 325 SC****FUNGICIDA**

**STROBZOL 325 SC** es un un fungicida con acción sistémica translaminar. Está compuesto por los ingredientes activos Azoxystrobin y Difenconazole.

**COMPOSICIÓN**

<b>NOMBRE</b>	<b>CONTENIDO (g/L)</b>
Azoxystrobin	250
Difenconazole	125
Aditivos	c.s.p.

**COMPATIBILIDAD**

Es incompatible con materiales ácidos y alcalinos fuertes. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de aplicar.

**COMPORTAMIENTO CON EL MEDIO AMBIENTE**

Muy tóxico para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO**

**STROBZOL 325 SC** está categorizado como ligeramente peligroso. Franja azul.

**MODO DE ACCIÓN**

**STROBZOL 325 SC** es un fungicida con acción sistémica translaminar, con actividad protectora, preventiva y curativa contra un amplio rango de enfermedades aéreas causadas por hongos; impidiendo así el transporte de electrones y la producción de energía mediante la fosforilación oxidativa, así como la biosíntesis del esterol de las membranas.

**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

<b>Estado físico</b>	: Líquido
<b>Color</b>	: Blanco
<b>pH</b>	: 5-8

## DOSIFICACIÓN

CULTIVO	PLAGA QUE CONTROLA	DOSIS L / ha	DOSIS L/200 L	RECOMENDACIONES
<b>PALTO</b>	Muerte regresiva Podredumbre gris Cladosporium	- - -	0.10-0.12 0.13 0.15-0.175	<b>Aplicaciones máximas por campaña: 2</b> <b>Periodo de reingreso: 12 horas</b> <b>Periodo de carencia: 28 días</b> <b>LMR: 2.0A 0.6D ppm</b>

## FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar, vía aspersión foliar terrestre, en palto, hasta 2 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña al año, y una frecuencia entre aplicaciones de 30 días; ante la aparición de los primeros síntomas o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

## RECOMENDACIONES DE USO

Verter el producto en un recipiente pequeño, pre-mezclar todo el producto a usar con un poco de agua hasta que se forme una solución uniforme, la misma que se debe verter en el tanque de aplicación que tiene 50% de su capacidad con agua, agitar y luego llenar con agua hasta completar su capacidad.

### RECOMENDACIONES EN CAMPO

Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (12 horas), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

### ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.

No almacenar en casas de habitación.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.