

**THURSFEST 6.4% WP****INSECTICIDA AGRÍCOLA**

TRUSFEST 6.4% WP es un insecticida biológico, formador de esporas, con cristales de proteínas. Está compuesto por *Bacillus thuringiensis* y aditivos.

COMPOSICIÓN

NOMBRE	CONTENIDO (g/Kg)
<i>Bacillus thuringiensis</i>	64 g/Kg
Aditivos	c.s.p. 1 Kg

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO

THURSFEST 6.4% WP está categorizado como Ligeramente Peligroso. Franja verde.

COMPATIBILIDAD

Es incompatible con compuestos ácidos y alcalinos fuertes. En caso de dudas sobre la compatibilidad efectuar pruebas en pequeña escala antes de aplicar.

MODO DE ACCIÓN

THURSFEST 6.4% WP es utilizado para el control de larvas de lepidópteros como *Oiketicus kirbyi*. Se recomienda aplicaciones en los primeros estadios larvales.

COMPORTAMIENTO CON EL MEDIO AMBIENTE

-En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.

-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.

-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.

-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	: Sólido
Color	: Blanco
pH	: 6.5

DOSIFICACIÓN

CULTIVO	PLAGA QUE CONTROLA	DOSIS L / ha	DOSIS L/200 L	RECOMENDACIONES
PALTO	Gusano del cesto <i>Oiketicus kirbyi</i>	-	0.45-0.5	Aplicaciones máximas por campaña: 2 Periodo de reingreso: 24 horas Periodo de carencia: N.A. LMR: N.A.
	Plaga del espárrago <i>Oxydia vesulia</i>	-	0.4-0.45	
	Gusano medidor <i>Sabulodes aegrotata</i>	-	0.45	
	Perforador de los frutos <i>Argyrotaenia sphaleropa</i>	1.00	-	

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar, vía aspersión foliar terrestre, en palto, hasta 2 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña al año, y una frecuencia entre aplicaciones de 10 - 12 días; ante la aparición de los primeros individuos o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la plaga.

RECOMENDACIONES DE USO

Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.

RECOMENDACIONES EN CAMPO

- Utilice suficiente volumen de agua en las aplicaciones.
- Se recomienda aplicar preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
- Seguir una estrategia basada en la adopción de programas de rotación, con aplicaciones intercaladas, con fungicidas de diferentes grupos de acción.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- No se recomienda almacenar, ni transportar junto a alimentos, medicinas, bebidas, entre otros productos.

